


## Vítáme Vás mezi majiteli zázračného živého plotu! Informace o produktu – návod na sázení

**BREST TURKESTÁNSKY** (*Ulmus p. Celer*) je opadavá rostlina tvořící hustý živý plot s malými, lesklými světlezelenými listy. Neuvěřitelně odolný, nenáročný druh vhodný do jakékoliv půdy. Pro intenzivní růst vyžaduje pravidelné zalévání. Po dosažení požadované výšky stačí polévání zmírnit a růst se zpomalí.

Jilm Turkestánský je ideální rostlinou pro sadbu živého plotu. Její roční růst může dosáhnout až 1,20-1,80 m, přičemž se Vaší pomocí i bohatě rozvětluje. Jilm může dorůst až do výšky 5 metrů. Živý plot běžné výšky se dá vypěstovat v průběhu 1,5-2 let. Dobře snáší stříhání. Díky drobným listům se z této rostliny může vytvořit jakákoliv prostorová forma. Obřezáváním dosáhnete keřovitou rozvětvenost. Obřezávání provádějte s 15-centimetrovým "roztečí".

### Návrh na výsadbu (živý plot):

#### 1) Po 20 cm do jedné řady 5 rostlin na metr



2) **Nebo do dvou řad.** V tomto případě tvoří dvojřadovou řadu 6-8 rostlin na metr. Dvouřadovou výsadbou dostaneme hezčí, hustší plot. (Dvouřadová výsadba se doporučuje, pokud chceme plot použít jako dělící prvek v prostoru.)



1. Před výsadbou namočíme kořeny 18 až 24 hodin, aby se dobře nasákly vodou.
2. Vykopanou zem můžeme obohatit kompostem; k těžkým, hlinitým půdám přidáme písek.
3. Umístíme rostlinu do jámy, která se vodou vylila do bahnitého, nasypeme zeminu ke kořenům, pak opatrně sešlápneme zem do tvrda, aby rostlina stála rovně. Dbejme na to, aby se kořeny neohnuli nepřirozeným způsobem - zpomalil by se tím růst.

**Tip:** Správnou pozici kořene můžeme zajistit, pokud po nasypání zeminy sešlápneme půdu pouze do polotvrda a rostlinu trochu (pár centimetrů) povytáhneme.

**Tip:** Pokud na půdu pod rostlinu uložíte speciální černé pletivo propouštějící dešťovou vodu, zabráníte růstu plevelů, půda lépe udrží vlhkost a Váš živý plot bude rychleji růst!

### Ošetřování:


#### 1. Důležité!

Sazenice vysazené na podzim až do 20. října a sazenice vysazené na jaře je nutné druhý den po výsadbě zkrátit na 10 - 15 cm nad zemí, aby se sazenice rozvětvila. Sazenice vysazené na podzim po datu 20. října stačí zkrátit v následujícím roce na jaře počátkem března. **Tento krok je velmi důležitý**, pokud neuděláte, nebo rostlinu litujete nedosáhnete požadovaného výsledku. Růst bude pomalý a živý plot řídký.

2. Při dostatečné zálivce začne neuvěřitelně rychle růst. V průběhu léta alespoň dvakrát zastříhnete dlouhé výhonky nejméně na poloviční délku. Postup zopakujeme alespoň jednou i na podzim. Při posledním obřezávání koncem podzimu ořežeme plot na přibližně stejnou výšku. První rok nenecháme jilm vyrůst vyšší než 1-1,2 metrů - snažme se spíše o to, aby byl plot hustý. Rostlina získá keřovitě rozvětvené ořezáváním. Čím blíže (10-12 cm) ji ořežeme ve srovnání s předchozím stříhem, živý plot se stane hustý.

**POZOR:** Zanedbání ořezávání bude mít za výsledek vysoký, řídký plot.

Na jaře druhého roku můžeme nechat plot dorůst až do dvoumetrové výšky. Protože rostlina tuto výšku dosáhne za velmi krátký čas, koncem jara už můžeme plot ostříhat do libovolného tvaru.



3. Škůdci má výhradně v obdobích následujících po mírné zimě. Během běžného zimního počasí tyto škůdci zahynou. Ničitele jsou nejčastěji mouchy, komáři a vlnovník révový. Na listech snadno rozpoznáte 6-12 mm dlouhý červený váček, ve kterém se vlnovník vyvíjí. Rostlinu sice znatelně nepoškodí, při masovém výskytu však plot ztrácí estetický vzhled. Abychom zabránili vývinu tohoto škůdce, doporučuje se po mírné zimě postříkat plot toxickým roztokem v období následujícím po klíčení.

#### Návrh na výsadbu (strom):

Postup je stejný, jako v případě živého plotu, brzy na jaře však neorežeme strom nad půdou, ale zastříhnete jeho boční výhonky, tvarujeme korunu.